

果樹農家のみなさまへ、時季ごとの耳より情報をお届けします



## 今年の開花はいつ？



- 今年の甲府における日平均気温の月平均値は **1月：2.6℃**(平年値 3.1℃)、**2月：3.5℃**(平年値 4.7℃) と平年より **やや寒い冬** でした(図)。
- この平均気温は過去 30 年間に於いて、低い方から 1月：11 位、2月：5 位の順位です。特に **2月の気温が低い** 傾向でした。
- 3月3日に発表された果樹試験場の **モモ開花予想** では、今年の開花始めは、標高 440m の果樹試験場で **4月5日** で、平年より **3日遅く**、2～3月の気温が高かった **昨年** に比べて **13日遅く** なっています。
- 近年続いていた著しい温暖化傾向は、今年は今のところ小休止と思われれます。なお、今後の天候状況により予想結果は変動しますので順次、**最新情報の入手** を願います。




図 令和4年1～2月の日平均気温の推移 (甲府)



## 開花期にアドマイヤー散布はしない



- 20～30年前より世界各地で **ミツバチ** の大量死や大量失踪、数の減少の事例が報告され、**蜂群崩壊症候群 (CCD)** と呼ばれています。
- CCD の発生原因としてさまざまな要因が検討されましたが、**ネオニコチノイド系農薬** が直接の原因であると科学的に証明されています。
- これらの結果を考慮して、**農薬の登録内容が変更** されています。
- モモでは、生育初期防除に使われる **アドマイヤー水和剤** の露地栽培での使用時期は、発芽期から開花期を避け、**落花後に限る** と変更されています。




図 開花期を迎えたモモの花を訪れるミツバチ